

کرم قوزه یا کرم بلال *Heliothis armigera*

این آفت میزبان های متعددی دارد ولی بیش از همه ذرت ، پنبه و گوجه فرنگی را مورد حمله قرار می دهد . خسارت این آفت در سال های اخیر روی ذرت رو به فزونی گذاشته و در اکثر مناطق ذرت کاری جزء آفات اقتصادی به حساب می آید.



حشره بالغ خوشه خوار ذرت

مناطق انتشار: در اکثر مناطق ذرت کاری به خصوص در استان های مازندران و گیلان و در اردبیل (دشت مغان) انتشار دارد .

خسارت : در مراحل اولیه رشد نبات سوراخ های تقریباً گرد روی برگ های جوان ایجاد و در مراحل بعدی از گل آذین نر ، نوک بلال و دانه ها تغذیه می کنند .



خسارت لارو خوشه خوار ذرت

مبارزه: شخم عمیق پاییزه و یخ آب زمستانه باعث از بین رفتن ذخیره زمستانی آفت شده و از انبوهی جمعیت در سال بعد خواهد کاست. سموم شیمیایی کم دوام مانند دیپترکس ۸۰٪ به نسبت ۱/۵ تا ۲ کیلوگرم در هکتار توصیه می شود. سموم دیگری نظیر فسدرین ۲۴٪ به میزان ۲/۵ لیتر، گوزاتیون ۲/۵ لیتر، آرودرین ۲۴٪ به میزان ۲/۵ لیتر نیز توصیه شده اند. موقع مبارزه هنگامی است که اکثر تخم ها تفریخ شده و لارو ها وارد میوه نشده باشند.